



Direction de la santé
Bureau de veille sanitaire

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Surveillance et veille sanitaire en Polynésie française

Données du 21 au 27 janvier 2013
(Semaine 04)

A RETENIR

Syndrome grippal

- Activités syndromique et virologique faibles.

Syndrome dengue

- Activité syndromique faible ; aucun cas confirmé sur 19 prélèvements analysés.

Diarrhées

- Activité modérée.

Fièvre

- Activité faible.

AUTRES ACTUALITES LOCALES

Salmonellose

- Quelques cas sont sporadiquement signalés (S. enteritidis et autres types).
- Les mesures de contrôle au sein des élevages incriminés continuent à se mettre en place (Arrêtés n°1649 et n°1651 du 15 novembre 2012).
- Par mesure de précaution, il est toujours recommandé de consommer les œufs bien cuits : blanc et jaune (cuisson 5 minutes au minimum à 65°C).

Leptospirose

- Suite aux importants épisodes pluvieux, le risque de leptospirose est toujours très important.
- **Les mesures de prévention primaire consistent à éviter le contact de la peau avec de l'eau ou de la boue pouvant être souillés par les urines d'animaux. En cas de signes évocateurs, une consultation rapide pour prélèvement et traitement est recommandée.**
- En janvier 2013, 17 cas de leptospirose ont été confirmés (aucun décès) ; 15 cas avaient été déclarés en décembre 2012
- Sur le total des 32 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, 23 étaient des hommes. 16 ont été hospitalisés (dont 6 en Réa). 1 est décédé (en décembre).

ACTUALITES REGIONALES ET INTERNATIONALES

(sources : InVS, PacNet, OMS, ProMed, autres)




Dengue - Nouvelle-Calédonie

- Depuis le début de la circulation du virus DEN I en Nouvelle-Calédonie en septembre 2012, 1413 cas ont été confirmés. En janvier, 940 cas ont été déclarés dont 295 en semaine 3 et 207 en semaine 4.
- L'ensemble du territoire semble être concerné.
- **Il est recommandé d'effectuer un prélèvement face à toute suspicion clinique de dengue, en particulier chez des personnes ayant voyagé en Nouvelle-Calédonie dans la semaine précédente.**
- Pour information complémentaire, consultez le site internet de la DASS Nouvelle-Calédonie : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante/veille_sanitaire/Dengue



Grippe

- L'épidémie de grippe A(H3N2) est en cours aux Etats-Unis, mais le nombre de cas est en diminution.
- La Nouvelle-Zélande et l'Australie rapportent une activité grippale faible.
- En France métropolitaine, l'activité épidémique grippale continue de s'intensifier dans toutes les régions (co-circulation de 3 virus : A(H3N2), A(H1N1) et B).
- L'épidémie de grippe se poursuit en Guadeloupe et en Martinique.



Grippe





Fièvre isolée




Dengue



Diarrhées



Indicateurs d'activité



Bulletin téléchargeable sur les sites suivants :

- Réseau Océanien de Surveillance de Santé Publique http://www.spc.int/phs/PPhSN/Surveillance/Routine_reports.htm
- Centre d'hygiène et de salubrité publique de la Direction de la santé <http://www.hygiene-publique.gov.pf/spip.php?article120>

Définitions utilisées pour la surveillance syndromique du réseau sentinelles

- Syndrome grippal : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale, ET accompagnée de myalgies ou fatigue, ET de signes respiratoires ou ORL
- Suspicion de dengue : Fièvre élevée ($\geq 38,5^{\circ}\text{C}$) d'apparition brutale de moins de 8 jours, ET syndrome algique (céphalées, arthralgies ou myalgies) ET absence de tout point d'appel infectieux (en particulier respiratoire)
- Diarrhées : au moins 3 selles liquides ou molles / jour, datant de moins de 14 jours ET motivant la consultation
- Fièvre isolée : Fièvre élevée ($> 38^{\circ}\text{C}$) de plus de 3 jours sans cause évidente

Définitions utilisées pour la surveillance virologique

- Cas confirmé de dengue : cas suspect avec au moins un résultat de biologie positif, AgNS1 / RT PCR / IgM

Codage CIM 10 utilisé pour la surveillance syndromique aux Urgences

- Syndrome grippal : J11
- Suspicion de dengue : A90 - A91
- Diarrhée : A02 à A09
- Fièvre isolée : R509

Remerciements aux partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française :

- Dispensaires et infirmeries de la Direction de la santé
- Centre de la mère et de l'enfant
- Réseau des médecins sentinelles
- Service de Santé des Armées
- Centre Hospitalier du Taaone
- Hôpitaux publics de Moorea, Taravao, Uturoa, Taiohae
- Institut Louis Malardé
- Laboratoires privés
- Cliniques privées Cardella et Paofai
- Pharmacie d'approvisionnement de la Direction de la Santé
- Pharmacies d'officine
- Centre d'hygiène et de salubrité publique
- Réseau informatique de santé publique de la Direction de la Santé

Bureau de veille sanitaire :

Responsable
Dr Henri-Pierre Mallet

Epidemiologiste
Anne-Laure Berry

Infirmiers
Jean-Paul Pescheux
Auguste Buluc

Secrétaire
Thilda Tehaamoana

Tél: 488 201

Fax: 488 212

Astreinte : 706 502

Mail : veille@sante.gov.pf