

La Liste rouge des espèces menacées en France

Oiseaux de Polynésie française

Décembre 2015

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Sous-espèce ¹ | Statut de présence ² | Endémisme ³ | Tendance ⁴ | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Critères Liste rouge Polynésie française | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|--|--------------------------------|
| Columbiformes | Columbidae | <i>Gallicolumba nui</i> | Gallicolombe géante | | | Société, Marquises, PO : Australes, Gambier, îles Cook | | EX | | NE |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Macropygia arevarevauupa</i> | Phasianelle de la Société | | | I : Huahine | | EX | | EX |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Macropygia heana</i> | Phasianelle des Marquises | | | A : Marquises | | EX | | EX |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus mercierii</i> | Ptilope de Mercier | | | A : Marquises | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallirallus epulare</i> | Râle de Nuku Hiva | | | I : Nuku Hiva | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallirallus gracilitibia</i> | Râle de Ua Huka | | | I : Ua Huka | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallirallus pacificus</i> | Râle teve'a | | | I : Tahiti | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallirallus roletti</i> | Râle de Tahuata | | | I : Tahuata | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallirallus steadmani</i> | Râle de Tubuai | | | I : Tubuai | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Gallirallus storrisoni</i> | Râle de Huahine | | | I : Huahine | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio mcnabi</i> | Poule sultane de Huahine | | | I : Huahine | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porphyrio paepae</i> | Poule sultane des Marquises | | | A : Marquises | | EX | | EX |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Porzana nigra</i> | Râle de Tahiti | | | I : Tahiti | | EX | | EX |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Prosobonia ellisi</i> | Chevalier de Ellis | | | I : Moorea | | EX | | EX |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Prosobonia leucoptera</i> | Chevalier à ailes blanches | | | I : Tahiti | | EX | | EX |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Larus utunui</i> | Mouette de Huahine | | | I : Huahine | | EX | | EX |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Todiramphus gambieri</i> | Martin-chasseur des Gambier | | | A : Gambier | | EX | | EX |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Sous-espèce ¹ | Statut de présence ² | Endémisme ³ | Tendance ⁴ | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Critères Liste rouge Polynésie française | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Cyanoramphus ulietanus</i> | Perruche de Raiatea | | | I : Raiatea | | EX | | EX |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Cyanoramphus zealandicus</i> | Perruche de Tahiti | | | I : Tahiti | | EX | | EX |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Vini sinotoi</i> | Lori de Sinoto | | | PO : Marquises, Société, Cook | | EX | | NE |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Vini vidivici</i> | Lori conquis | | | PO : Marquises, Société, Cook | | EX | | NE |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus astrolabii</i> | Rousserolle des Gambier | | | A : Gambier | | EX | | EX |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus musae</i> | Rousserolle des îles-sous-le-Vent | | | A : Société | | EX | | EX |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Aplonis diluvialis</i> | Stourne de Huahine | | | I : Huahine | | EX | | EX |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea fluxa</i> | Monarque de Eiao | | | I : Eiao | | EX | | EX |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea nukuhiavae</i> | Monarque de Nuku Hiva | | | I : Nuku Hiva | | EX | | EX |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea pomarea</i> | Monarque de Maupiti | | | I : Maupiti | | EX | | EX |
| Passeriformes | Turdidae | <i>Turdus ulietensis</i> | Stourne de Raiatea | | | I : Raiatea | | EX | | EX |
| Ciconiiformes | Sulidae | <i>Papasula abbotti</i> | Fou d'Abbott | ssp. <i>costelloi</i> | | (A) : Marquises | | RE | | EN |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus longirostris</i> | Rousserolle de Moorea | | N | I : Moorea | ? | CR* | D | EX |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea mira</i> | Monarque de Ua Pou | | N | I : Ua Pou | ↘ | CR* | A2a B(1+2)ab(v) C2a(i) D | CR |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Alopecoenas erythropterus</i> | Gallicolombe érythroptère | | N | A : Tuamotu | ↘ | CR | B2ab(v) C2a(i) | CR |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Butorides striata</i> | Héron strié | ssp. <i>patruelis</i> | N | (I) : Tahiti | ↘ | CR | C2a(ii) | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Todiramphus gertrudae</i> | Martin-Chasseur de Niau | | N | I : Niau | → | CR | B(1+2)ab(iii) | CR |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Todiramphus godeffroyi</i> | Martin-Chasseur des Marquises | | N | I : Tahuata | ↘ | CR | B1ab(iii,v) | CR |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Vini kuhlii</i> | Lori de Kuhl | | N | PO : Australes, Cook | → | CR | B2ab(iii,v) | EN |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Vini ultramarina</i> | Lori ultramarin | | N | I : Ua Huka | ? | CR | B1ab(iii) | EN |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus rimitarae</i> | Rousserolle de Rimatara | | N | I : Rimatara | → | CR | B(1+2)ab(iii) | VU |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea nigra</i> | Monarque de Tahiti | | N | I : Tahiti | ↗ | CR | D | CR |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea whitneyi</i> | Monarque de Fatu Hiva | | N | I : Fatu Hiva | ↘ | CR | A2a B(1+2)ab(v) C2a(i,ii) D | CR |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ducula galeata</i> | Carpophage des Marquises | | N | A : Marquises | ↗ | EN | D | EN |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus chrysogaster</i> | Ptilope des îles-sous-le-Vent | | N | A : Société | ↘ | EN | B2ab(iii,v) | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus huttoni</i> | Ptilope de Hutton | | N | I : Rapa | ? | EN | B(1+2)ab(iii) | VU |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Fregatta grallaria</i> | Océanite à ventre blanc | ssp. <i>titan</i> | N | (I) : Rapa | ↘ | EN | B2ab(iii,v) C2a(ii) | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Nesofregatta fuliginosa</i> | Océanite à gorge blanche | | N | | ↘ | EN | C2a(i) | EN |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Bulweria bulwerii</i> | Pétrel de Bulwer | | N | | ↘ | EN | C2a(i) | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma brevipes</i> | Pétrel à collier | | N | PF : Société, Australes | ↘ | EN | B2ab(iii,v) C2a(i) D | VU |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma nigripennis</i> | Pétrel à ailes noires | | N | | ↘ | EN | B2ab(iii,v) | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus auricularis</i> | Puffin de Townsend | ssp. <i>myrtae</i> | N | (I) : Rapa | ↘ | EN | B2ab(iii,v) C2a(i) | CR |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Prosobonia parvirostris</i> | Chevalier des Tuamotu | | N | A : Tuamotu | ↘ | EN | B2ab(iii,v) | EN |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Onychoprion lunatus</i> | Sterne à dos gris | | N | | ↘ | EN | C2a(i) | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Sous-espèce ¹ | Statut de présence ² | Endémisme ³ | Tendance ⁴ | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Critères Liste rouge Polynésie française | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|--|--------------------------------|
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus caffer</i> | Rousserolle de Tahiti | | N | I : Tahiti | ↘ | EN | B2ab(iii,v) C2a(i) | EN |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea iphis</i> | Monarque iphis | | N | I : Ua Huka | → | EN | B(1+2)ab(iii) | VU |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea mendozae</i> | Monarque marquisien | | N | I : Mohotani | → | EN | D | EN |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas superciliosa</i> | Canard à sourcils | | N | | ↘ | VU | C2a(i) D1 | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Alopecoenas rubescens</i> | Gallicolombe des Marquises | | N | A : Marquises | → | VU | D2 | VU |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ducula aurorae</i> | Carpophage de la Société | | N | I : Makatea | ↗ | VU | D1+2 | EN |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Aerodramus leucophaeus</i> | Salangane de la Société | | N | I : Tahiti | ? | VU | D1+2 | VU |
| Gruiformes | Rallidae | <i>Zapornia tabuensis</i> | Marouette fuligineuse | | N | | ↘ | VU | C2a(i) | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma alba</i> | Pétrel à poitrine blanche | | N | | → | VU | D1+2 | EN |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Numenius tahitiensis</i> | Courlis d'Alaska | | V | | ↘ | VU | C2a(ii) | VU |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Thalasseus bergii</i> | Sterne huppée | | N | | ↘ | VU | C2a(i) | LC |
| Psittaciformes | Psittacidae | <i>Vini peruviana</i> | Lori nonnette | | N | PO : Société, Tuamotu, Cook | ↘ | VU | B2ab(iii,v) | VU |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus coralensis</i> | Ptilope des Tuamotu | | N | A : Tuamotu | ↘ | NT | pr. C2a | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Ardenna pacifica</i> | Puffin fouquet | | N | | ↘ | NT | pr. C2a | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pseudobulweria rostrata</i> | Pétrel de Tahiti | ssp. <i>rostrata</i> | N | | ↘ | NT | pr. C2a | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma heraldica</i> | Pétrel du Hérald | | N | | → | NT | pr. B2a D2 | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma neglecta</i> | Pétrel de Kermadec | | N | | → | NT | pr. B2a D2 | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma ultima</i> | Pétrel de Murphy | | N | PO : Tuamotu, Gambier, Australes, Pitcairn | → | NT | pr. B2b(iii) D1 | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus nativitatis</i> | Puffin de la Nativité | | N | | → | NT | pr. B2b(iii) | LC |
| Ciconiiformes | Sulidae | <i>Sula leucogaster</i> | Fou brun | | N | | ? | NT | pr. C2a(i) | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Todiramphus tutus</i> | Martin-Chasseur respecté | ssp. <i>tutus</i> | N | (A) : Société | ? | NT | pr. B2a | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Todiramphus youngi</i> | Martin-Chasseur de Young | | N | I : Moorea | → | NT | pr. B(1+2)a | NT |
| Passeriformes | Hirundinidae | <i>Hirundo tahitica</i> | Hirondelle de Tahiti | ssp. <i>tahitica</i> | N | (A) : Société | ? | NT | pr. D1 | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus dupetithouarsii</i> | Ptilope Dupetit-Thouars | | N | A : Marquises | → | LC | | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus purpuratus</i> | Ptilope de la Société | | N | A : Société | → | LC | | LC |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Aerodramus ocistus</i> | Salangane des Marquises | | N | A : Marquises | → | LC | | LC |
| Cuculiformes | Cuculidae | <i>Urodynamys taitensis</i> | Coucou de Nouvelle-Zélande | | V | | ? | LC | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Macronectes giganteus</i> | Fulmar géant | | V | | ↗ | LC | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Macronectes halli</i> | Fulmar de Hall | | V | | ↗ | LC | | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus bailloni</i> | Puffin tropical | | N | | → | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Phaethontidae | <i>Phaethon lepturus</i> | Phaéon à bec jaune | | N | | ? | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Phaethontidae | <i>Phaethon rubricauda</i> | Phaéon à brins rouges | | N | | ? | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Egretta sacra</i> | Aigrette sacrée | | N | | → | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Fregatidae | <i>Fregata ariel</i> | Frégate ariel | | N | | → | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Fregatidae | <i>Fregata minor</i> | Frégate du Pacifique | | N | | → | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Sulidae | <i>Sula dactylatra</i> | Fou masqué | | N | | ↗ | LC | | LC |
| Ciconiiformes | Sulidae | <i>Sula sula</i> | Fou à pieds rouges | | N | | → | LC | | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Sous-espèce ¹ | Statut de présence ² | Endémisme ³ | Tendance ⁴ | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Critères Liste rouge Polynésie française | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--|--------------------------------|
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis fulva</i> | Pluvier fauve | | V | | ? | LC | | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris alba</i> | Bécasseau sanderling | | V | | ? | LC | VU (D1) (-2) | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Heteroscelus incanus</i> | Chevalier errant | | V | | → | LC | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Anous minutus</i> | Noddi noir | | N | | → | LC | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Anous stolidus</i> | Noddi brun, noddi niais | | N | | → | LC | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Gygis alba</i> | Gygis blanche | <i>ssp. candida</i> | N | | → | LC | | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Procelsterna cerulea</i> | Noddi bleu | | N | | ? | LC | | LC |
| Charadriiformes | Sternidae | <i>Onychoprion fuscatus</i> | Sterne fuligineuse | | N | | ↘ | LC | | LC |
| Coraciiformes | Alcedinidae | <i>Todirhamphus veneratus</i> | Martin-Chasseur vénéré | | N | I : Tahiti | → | LC | | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus atyphus</i> | Rousserolle des Tuamotu | | N | A : Tuamotu | ↘ | LC | | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus mendanae</i> | Rousserolle des Marquises du Sud | | N | A : Marquises | → | LC | | LC |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus percernis</i> | Rousserolle des Marquises du Nord | | N | A : Marquises | → | LC | | LC |

(1) Précision apportée lorsque l'espèce est représentée en Polynésie française par une seule sous-espèce.

(2) N : espèce nicheuse ; V : espèce visiteuse régulière (hivernante, estivante ou de passage).

(3) I : espèce endémique d'une île ; A : espèce endémique d'un archipel ; PF : espèce endémique de Polynésie française ; PO : espèce endémique de Polynésie orientale.
Lorsque l'espèce est représentée en Polynésie française par une seule sous-espèce, le statut d'endémisme de la sous-espèce est indiqué entre parenthèses.

(4) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des sous-espèces ayant fait l'objet d'une évaluation particulière

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Statut de présence ¹ | Endémisme ² | Tendance ³ | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Critères Liste rouge Polynésie française |
|---------------|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|---|--|
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus mercierii mercierii</i> | Ptilope de Mercier | | A : Marquises | | EX | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus mercierii tristrami</i> | Ptilope de Mercier | | I : Hiva Oa | | EX | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus musae garretti</i> | Rousserolle des îles sous le Vent | | I : Huahine | | EX | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus musae musae</i> | Rousserolle des îles sous le Vent | | I : Raiatea | | EX | |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea mendozae mendozae</i> | Monarque des Marquises | | I : Ua Huka | | EX | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus atyphus palmarum</i> | Rousserolle des Tuamotu | N | I : Ana'a | ↘ | EN | B(1+2)ab(iii,v) |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus percernis postremus</i> | Rousserolle des Marquises du nord | N | I : Hatuta'a | → | EN | D |
| Passeriformes | Muscicapidae | <i>Pomarea mendozae motanensis</i> | Monarque des Marquises | N | I : Mohotani | → | EN | D |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus coralensis coralensis</i> | Ptilope des Tuamotu | N | A : Tuamotu | ↘ | VU | C2a(i) |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus atyphus atyphus</i> | Rousserolle des Tuamotu | N | A : Tuamotu | ↘ | VU | C2a(i) |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus mendanae consobrinus</i> | Rousserolle des Marquises du sud | N | I : Mohotani | → | VU | D1 |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus percernis aquilonis</i> | Rousserolle des Marquises du nord | N | I : Eiao | ↗ | VU | D1 |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus coralensis chalcurus</i> | Ptilope de Makatea | N | I : Makatea | → | NT | pr. D1+2 |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus purpuratus frater</i> | Ptilope de Moorea | N | I : Moorea | → | NT | pr. B2a |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus atyphus eremus</i> | Rousserolle des Tuamotu | N | I : Makatea | → | NT | pr. B2a D2 |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus atyphus niauensis</i> | Rousserolle des Tuamotu | N | I : Niau | → | NT | pr. D1+2 |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus mendanae mendanae</i> | Rousserolle des Marquises du sud | N | A : Marquises | ↘ | NT | pr. B2a |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus dupetithouarsii dupetithouarsii</i> | Ptilope Dupetit-Thouars | N | A : Marquises | → | LC | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus dupetithouarsii viridior</i> | Ptilope Dupetit-Thouars | N | A : Marquises | → | LC | |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Ptilinopus purpuratus purpuratus</i> | Ptilope de Tahiti | N | I : Tahiti | → | LC | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Aerodramus ocistus gilliardi</i> | Salangane des Marquises (sud) | N | A : Marquises | → | LC | |
| Apodiformes | Apodidae | <i>Aerodramus ocistus ocistus</i> | Salangane des Marquises (nord) | N | A : Marquises | → | LC | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus mendanae dido</i> | Rousserolle des Marquises du sud | N | I : Ua Pou | → | LC | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus mendanae fatuhivae</i> | Rousserolle des Marquises du sud | N | I : Fatu Hiva | → | LC | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus percernis idae</i> | Rousserolle des Marquises du nord | N | I : Ua Huka | → | LC | |
| Passeriformes | Sylviidae | <i>Acrocephalus percernis percernis</i> | Rousserolle des Marquises du nord | N | I : Nuku Hiva | → | LC | |

(1) N : sous-espèce nicheuse.

(2) I : sous-espèce endémique d'une île ; A : sous-espèce endémique d'un archipel.

(3) Tendance d'évolution des populations : en augmentation (↗), en diminution (↘), stable (→) ou inconnue (?).

Liste des espèces présentes en Polynésie française non soumises à l'évaluation

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas acuta</i> | Canard pilet | NA ^b | LC |
| Anseriformes | Anatidae | <i>Anas clypeata</i> | Canard souchet | NA ^b | LC |
| Galliformes | Phasianidae | <i>Gallus gallus</i> | Coq bankiva* | NA ^a | LC |
| Falconiformes | Accipitridae | <i>Circus approximans</i> | Busard de Gould | NA ^a | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Columba livia</i> | Pigeon biset | NA ^a | LC |
| Columbiformes | Columbidae | <i>Geopelia striata</i> | Géopélie zébrée | NA ^a | LC |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Diomedea epomophora</i> | Albatros royal | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Diomedea exulans</i> | Albatros hurleur | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Phoebastria palpebrata</i> | Albatros fuligineux à dos clair | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Thalassarche chrysostoma</i> | Albatros à tête grise | NA ^b | EN |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Thalassarche eremita</i> | Albatros des Chatham | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Diomedeidae | <i>Thalassarche melanophris</i> | Albatros à sourcils noirs | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Fregetta tropica</i> | Océanite à ventre noir | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Hydrobates castro</i> | Pétrel de Castro | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Hydrobates leucorhous</i> | Pétrel cul-blanc | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Oceanites oceanicus</i> | Pétrel de Wilson | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Hydrobatidae | <i>Pelagodroma marina</i> | Pétrel frégate | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Daption capense</i> | Damier du Cap | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Procellaria cinerea</i> | Pétrel gris | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma cookii</i> | Pétrel de Cook | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma externa</i> | Pétrel de Juan Fernández | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma inexpectata</i> | Pétrel maculé | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma lessonii</i> | Pétrel de Lesson | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma macroptera</i> | Pétrel noir | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma mollis</i> | Pétrel soyeux | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Pterodroma sandwichensis</i> | Pétrel des Hawaii | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus carneipes</i> | Puffin à pieds pâles | NA ^b | LC |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus creatopus</i> | Puffin à pieds roses | NA ^b | VU |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus griseus</i> | Puffin fuligineux | NA ^b | NT |
| Procellariiformes | Procellariidae | <i>Puffinus tenuirostris</i> | Puffin à bec grêle | NA ^b | LC |
| Ciconiiformes | Phaethontidae | <i>Phaethon aethereus</i> | Phaéton à bec rouge | NA ^b | LC |
| Ciconiiformes | Ardeidae | <i>Bubulcus ibis</i> | Héron garde-boeufs | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Charadrius semipalmatus</i> | Pluvier semipalmé | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Charadriidae | <i>Pluvialis squatarola</i> | Pluvier argenté | NA ^b | LC |

| Ordre | Famille | Nom scientifique | Nom commun | Catégorie Liste rouge Polynésie française | Catégorie Liste rouge mondiale |
|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Arenaria interpres</i> | Tournepieuvre à collier | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris acuminata</i> | Bécasseau à queue pointue | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Calidris melanotos</i> | Bécasseau tacheté | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Limosa lapponica</i> | Barge rousse | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Philomachus pugnax</i> | Chevalier combattant | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa flavipes</i> | Petit Chevalier à pattes jaunes | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Scolopacidae | <i>Tringa semipalmata</i> | Chevalier semipalmé | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius parasiticus</i> | Labbe parasite | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Stercorariidae | <i>Stercorarius pomarinus</i> | Labbe pomarin | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus atricilla</i> | Mouette atricille | NA ^b | LC |
| Charadriiformes | Laridae | <i>Leucophaeus pipixcan</i> | Mouette de Franklin | NA ^b | LC |
| Strigiformes | Strigidae | <i>Bubo virginianus</i> | Grand-duc de Virginie | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Ploceidae | <i>Ploceus melanocephalus</i> | Tisserin à tête noire | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Estrilda astrild</i> | Astrils bec de corail | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Lonchura castaneothorax</i> | Capucin donacole | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Estrildidae | <i>Neochmia temporalis</i> | Diamant à cinq couleurs | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Emberizidae | <i>Ramphocelus dimidiatus</i> | Tangara à dos rouge | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Pycnonotidae | <i>Pycnonotus cafer</i> | Bulbul à ventre rouge | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Zosteropidae | <i>Zosterops lateralis</i> | Zosterops à dos gris | NA ^a | LC |
| Passeriformes | Sturnidae | <i>Acridotheres tristis</i> | Merle des Moluques | NA ^a | LC |

(a) Espèce introduite en Polynésie française dans la période récente (après l'an 1500) ; sauf (*) le Coq bankiva introduit par les premiers Polynésiens (après l'an 800).

(b) Espèce présente en Polynésie française de manière occasionnelle ou marginale.

La Liste rouge des espèces menacées en France

Etablie conformément aux critères de l'UICN, la Liste rouge des espèces menacées en France vise à dresser un bilan objectif du degré de menace pesant sur les espèces de la faune et de la flore à l'échelle du territoire national. Cet inventaire de référence, fondé sur une solide base scientifique et réalisé à partir des meilleures connaissances disponibles, contribue à mesurer l'ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever pour la France, en métropole et en outre-mer.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.uicn.fr/Liste-rouge-France.html et <http://inpn.mnhn.fr>

Chapitre Oiseaux de Polynésie française

Coordination - Sébastien Moncorps (directeur UICN France) et Jean-Philippe Sibley (directeur SPN / MNHN)

Mise en œuvre - Lucie Dufay (UICN France), Guillaume Gigot (SPN / MNHN), Florian Kirchner (UICN France), Shankar Meyer (SPN / MNHN)

Compilation des données et pré-évaluations - Philippe Raust (SOP Manu)

Comité d'évaluation

Experts : Caroline Blanvillain (SOP Manu), Jean-François Butaud (expert indépendant), Frédéric Jacq (expert indépendant), Jean-Yves Meyer (Délégation à la recherche Polynésie française), Philippe Raust (SOP Manu)

Evaluateurs Liste rouge : Guillaume Gigot (MNHN), Florian Kirchner (UICN France)

Autres contributeurs

Alice Cibois (Muséum d'histoire naturelle, Genève), Thomas Ghestemme (SOP Manu), Jean-Claude Thibault (MNHN)

Avec l'appui de - Christophe Brocherieux (DIREN Polynésie française) et Claude Serra (DIREN Polynésie française)

Les catégories de l'UICN pour la Liste rouge

Espèces menacées de disparition de Polynésie française :

| | |
|-----------|--|
| CR | En danger critique L'indication « * » signale une espèce probablement diaprué |
| EN | En danger |
| VU | Vulnérable |

Autres catégories :

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de Polynésie française est faible)

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en Polynésie française de manière occasionnelle ou marginale)

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Méthodologie

La méthodologie utilisée pour l'évaluation est celle de l'UICN, décrite dans les deux guides :

- Catégories et critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 3.1 (2012)
- Lignes directrices pour l'application, au niveau régional, des critères de l'UICN pour la Liste rouge : Version 4.0 (2012)

Tous deux sont disponibles en téléchargement à l'adresse : www.uicn.fr/La-Liste-rouge-des-especes.html

Notation des critères de classement

- Pour les espèces menacées, le classement dans l'une des catégories CR, EN ou VU est justifié par les critères (A à E) et sous-critères (1, 2, 3... ; a, b, c... ; i, ii, iii...) dont les seuils sont remplis.

Ex. *Vini kuhlii* → Catégorie : CR ; Critère : B2ab(iii,v)

- Pour les espèces classées en catégorie NT, les critères ayant conduit à considérer l'espèce proche de la catégorie VU sont précisés à la suite du préfixe « pr. ».

Ex. *Sula leucogaster* → Catégorie : NT ; Critère : pr. C2a(i)

- Pour les espèces dont l'évaluation au niveau de la Polynésie française a nécessité un ajustement en raison de l'influence de populations extérieures, la catégorie initiale avant ajustement est mentionnée avec ses critères justificatifs, suivie du nombre de degrés dont cette catégorie a été déclassée (-1, -2...) ou surclassée (+1, +2...) dans la seconde étape de l'évaluation pour obtenir la catégorie finale.

Ex. *Calidris alba* → Catégorie : LC ; Critère : VU (D1) (-2)

Citation des résultats : UICN France, MNHN & SOP Manu (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de Polynésie française. Paris, France.

La Liste rouge des espèces menacées en France



Le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est le réseau des organismes et des experts de l'UICN en France. Regroupant au sein d'un partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics et 40 organisations non-gouvernementales, il joue un rôle de plate-forme d'expertise et de concertation pour répondre aux enjeux de la biodiversité.

Le Comité français de l'UICN rassemble également un réseau de plus de 250 experts répartis en cinq commissions thématiques, dont la Commission de sauvegarde des espèces qui réunit 140 spécialistes. L'UICN International a développé la méthodologie de référence pour guider les pays dans l'élaboration de leur Liste rouge nationale des espèces menacées.

www.uicn.fr



Le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) est un établissement public à caractère scientifique et culturel, placé sous la double tutelle des Ministères de la recherche et de l'écologie. Ses missions sont la recherche, la gestion des collections, l'enseignement, l'expertise et la diffusion des connaissances. Institution de renommée internationale, le MNHN dispose grâce aux travaux de ses scientifiques d'une expertise reconnue sur la biodiversité et sa conservation.

Le Service du patrimoine naturel du MNHN est responsable de la conduite scientifique de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN). Pour réaliser cette mission, il développe un système d'information national sur la nature rassemblant la connaissance sur la biodiversité et la géodiversité.

www.mnhn.fr/spn

Chapitre Oiseaux de Polynésie française réalisé en partenariat avec :



Fondée en 1990, la Société d'ornithologie de Polynésie (SOP Manu) œuvre pour la protection des oiseaux sauvages de Tahiti et ses îles ainsi que pour la préservation de leurs habitats. L'association contribue à l'étude des oiseaux de Polynésie, en organisant régulièrement des prospections et des missions ornithologiques, et en coordonnant des programmes de suivi et de protection des espèces menacées. Elle participe activement à des actions éducatives et de sensibilisation du public et publie régulièrement le bulletin « Te Manu ».

La SOP Manu est membre de la Fédération des associations de protection de la nature « Te Ora Naho » et partenaire de BirdLife International, fédération mondiale d'associations œuvrant pour la conservation des oiseaux. Elle a été reconnue d'intérêt général par le gouvernement de la Polynésie française en 1999.

www.manu.pf

Avec l'appui de :



Avec le soutien de :

